



Τμήμα : Επιδημιολογικής Επιπήρησης & Παρεμβασης
Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Πληροφορίες : Ε. Μαλτέζου, Θ. Γεωργακοπούλου
Διεύθυνση : Άγραφων 3-5, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας : 151 23
Τηλέφωνο : 210-6212173, 210-8899049
FAX : 210-8899103

Αθήνα,/...../2017

Αρ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:

Κ.κ. Διοικητές Νοσοκομείων
Κ.κ. Διευθυντές Κέντρων Υγείας
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

- Πρόεδρος Επιπροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείου
- Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου
- Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με επιδημία ιλαράς σε εξέλιξη σε Ευρωπαϊκές χώρες και αναγκαιότητα έγκαιρης ανίχνευσης και δήλωσης στο ΚΕΕΛΠΝΟ ύποπτων κρουσμάτων»

Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι τους τελευταίους μήνες είναι σε εξέλιξη επιδημία ιλαράς σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Σύγκεκριμένα, από τον Φεβρουάριο 2016 είναι σε εξέλιξη επιδημία ιλαράς στην Ρουμανία, χυρίως στο δύτικό τμήμα της χώρας, με 3.446 κρούσματα και 17 θανάτους (έως 17 Μαρτίου 2017). Τον Ιανουάριο 2017, αναφέρθηκαν συνολικά 474 κρούσματα σε 7 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Ουκρανία και Πολωνία), από τα οποία τα 283 στη Ιταλία, με ραγδαία αύξηση των νέων λοιμώξεων και νοσοκομειακές συρροές.

Σπρι χώρα μας, κατά τα έτη 2015, 2016 και μέχρι σήμερα, δεν έχει δηλωθεί κανένα κρούσμα ιλαράς μέσω του Συστήματος Υπόχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΣΥΔΝ). Να σημειωθεί ότι η τελευταία επιδημία ιλαράς καταγράφηκε στη χώρα μας τα έτη 2010 και 2011 με 149 και 40 κρούσματα αντίστοιχα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει θέσει ως στόχο την εξάλεψη της ιλαράς από τις Ευρωπαϊκές χώρες ως το 2020 και έχει εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο. Ο ΠΟΥ συστήνει προς τα κράτη-μέλη του να διενεργούν ενισχυμένη επιδημιολογική επιπήρηση της ιλαράς.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε της προσοχή σας για την έγκαιρη ανίχνευση και δήλωση ύποπτου κρούσματος ιλαράς και την άμεση λήψη των μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου στον νοσοκομειακό χώρο. Υπενθυμίζεται ότι η ιλαρά μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα σε κλειστούς χώρους υπό τις συνθήκες ιουνωστισμού, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, ακόμη και 4 ημέρες πριν την έκθυση του έξανθηματος. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί μεγάλες επιδημίες ιλαράς σε νοσοκομεία της εξωγενεικού, στα πλαίσια επιδημιών ιλαράς στην κοινότητα ή εισαγόμενου κρούσματος με ιστορικού ταξιδιού σε χώρα με επιδημία ιλαράς.

Επίσης, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο επαγγελματικής έκθεσης στον ίδιο της ιλαράς και επομένως εμφάνισης νόσου, σε τερπίτωση που είναι επίνοστο. Στη χώρα μας, η Εθνική Επιπροπή Εμβολιασμών του


Υπουργείου Υγείας συστήνει τον εμβολιασμό των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών ιγνείας με 2 δόσεις του εμβολίου έναντι Ιλαράς-Παρωτίδας-Ερυθράς (Measles-Mumps-Rubella, MMR). Άνοδοι έναντι της Ιλαράς θεωρούνται όσοι έχουν κάνει 2 δόσεις εμβολίου ή έχουν ιστορικό νόσου.

Να σημειωθεί ότι όλα τα μποτιτά κρούσματα Ιλαράς πρέπει να δηλώνονται στο Υμήνα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέσω του δελτίου υποχρεωτικής δήλωσης με έμφαση στη συμπλήρωση όλων των πεδίων και αποστολή του με fax (fax no: 210 8842 011) και να αποστέλλονται δείγματα βιολογικού υλικού στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς / Ερυθράς – Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur (Διαπιστευμένο από το ΠΟΥ) για εργαστηριακή επιβεβαίωση της Ιλαράς. Επισημαίνεται ότι ο ορολογικός έλεγχος των αντισωμάτων abt Ιλαράς καθώς και η RT-PCR φαρυγγικού επιχρίσματος πράγματοποιούνται διωρεάν από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ιλαράς / Ερυθράς (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα. Τηλ: 210 6478800, 210 6478819)


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Η Υπεύθυνη του Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Χιμικοεστίων Υγείας



Η Υπεύθυνη του Ταμείου Επιδημιολογικής Στατιστικής και Προβλεψης



Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Πρόεδρου
 2. Τμήμα Πορεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 3. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Koryottointi:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Υπ. Υγείας
 2. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, Υπ. Υγείας
 3. Γραφείο Προϊσταμένου Δ/νσης Δημόσιας Υγειεινής Υπ. Υγείας
 4. Καθηγητήριά Παιδιατρικής κα Μ. Παπαγρηγορίου – Θεοδωρίδου, Πρόεδρο Εθνικής Επιπροπής Ιατροποίησης για την εξαλειψη της ιλαράς και ερυθράς στην Ελλάδα
 5. Α. Μεντή, Διευθυντή Διαγνωστικού Τμήματος Ελληνικού Ινστιτούτου Παυτέρ



ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ &
ΠΡΟΔΗΣΗΣ ΝΟΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.Π.Ν.Ο.)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ

Αντιπρόεδρος
Αγάπιος Τερζίδης

Μέλη
Ουρανία Δαφνή
Μαρία Καντζανού
Δημήτριος Κουντουράς
Μαρία Μιχάκου
Ευσταθία Πανοποιόλου
Γρηγόριος Ροκαδάκης
Αθηνά Φαραζή

Αναπληρωματικά μέλη
Δημήτριος Βαρνάβας
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Μαγδαληνή Γαβανά
Ελένη Ιωαννίδη
Δημήτρα Καββαθά
Δημήτριος Καραϊσκός
Χρυσούλα Μπίσικα
Θεοδώρα Σταύρου
Βάνα Σύντα.

Διεύθυνση
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
ΤΚ:15123
τηλέφωνο: 210 5212007
& 210 5212010

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.keeelpno.gr

Ηλεκτρονικά ταχυδρομείο
president@keeelpno.gr

Μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
Facebook: @keeelpno
Twitter: @keeelpno_gr

Προς
-Τους Διοικητές ΥΠΕ

-όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας
Διοικητή Νοσοκομείου ΙΚΥ
Διευθυντή ΤΕΠ
Πρόεδρο ΕΝΑ
Διευθυντή ιατρικής Υπηρεσίας

Αθήνα 16 Μαΐου 2017

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Όπως γνωρίζετε από την αρχή του έτους έχουν αναφερθεί περισσότερα από 6.000 κρούσματα ιλαράς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ουκρανία, Πολωνία). Φαίνεται ότι το επίκεντρο της επιδημίας είναι οι δυτικές επαρχίες της Ρουμανίας όπου έως 5 Μαΐου 2017 είχαν αναφερθεί 5290 κρούσματα και 25 θάνατοι.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ θεωρεί ότι το θέμα έχει μείζον ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και σε συνέχεια της υπ' αρ. πρωτ. οικ.5550-5/4/2017 επιστολής, με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με επιδημία ιλαράς σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκές χώρες και αναγκαιότητα έγκαιρης ανίχνευσης και δήλωσης στο ΚΕΕΛΠΝΟ ύποπτων κρουσμάτων» επιθυμούμε να επιστήσουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη εγρήγορσης για την έγκαιρη ανίχνευση και δήλωση ύποπτου κρουσματος καθώς και για τον έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει προχωρήσει στην δημούργια Ομάδας Άμεσης Απόκρισης για την επιδημιολογική επιπήρηση της νόσου τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο καθώς και για την ανάπτυξη στρατηγικών εμβολιασμού επίνοισαν πληθυσμών (πρόσφυγες, Ρομά).

Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μας προκειμένου να υπάρξει μία έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική επιπήρηση τυχόν κρουσμάτων της νόσου στη χώρα μας.

Με εκπίμπηση

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ
αν. Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Ε.Π.Ν.Ο

16 Μαΐου 2017



Επιδημία ιλαράς σε Ευρωπαϊκές χώρες - πρόληψη νοσοκομειακής μετάδοσης ιλαράς

Σας ενημερώνουμε ότι κρούσματα ιλαράς κατ' επιδημίες σύνεχιζουν να εμφανίζονται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα στη Ρουμανία, από όπου ξεκίνησε η επιδημία, έχουν δηλωθεί 5.119 κρούσματα από το Φεβρουάριο του 2016 μέχρι και τις 28 Απριλίου 2017. Κρούσματα και νοσοκομειακές σύρροξες έχουν καταγραφεί και στις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ουγγαρία, Πόλωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία. Στην Ελλάδα δεν έχει δηλωθεί κανένα κρούσμα από το 2015 μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί μεγάλες νοσοκομειακές επιδημίες ιλαράς σε νοσοκομεία του εξωτερικού, στα πλαίσια επιδημίας στην κοινότητα ή λόγω εισαγόμενου κρούσματος με ιστορικό ταξδιού με επιδημία ιλαράς. Λόγω της εξαιρετικά εύκολης μετάδοσης της ιλαράς σε κλειστούς χώρους υπό συνθήκες συνωστισμού, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

Η ιλαρά αποτελεί εμπύρετη εξανθηματική νόσο που μεταδίδεται αερογενώς μέσω αναπνευστικών σταγονίδων ή με επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού. Η μετάδοση μπορεί να γίνει μέχρι και 3-4 ημέρες περιν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και μέχρι 5 ημέρες μετά την έκθυση του εξανθηματος. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 7 έως 21 ημέρες. Σε περίπτωση υποψίας ιλαράς απαιτείται άμεση απομόνωση του ασθενή μέχρι και 5 ημέρες μετά την έκθυση του εξανθηματος και αυστηρή εφαρμογή αερογενών προφυλάξεων και προφυλάξεων σταγονίδιων. Ειδικά για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συνιστάται η άμεση απομόνωση ασθενή με εικόνα συμβατή με ιλαρά σε ειδικό χώρο όπου θα εξετασθεί από ιατρονοστηλευτικό προσωπικό εφαρμόζοντάς τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Οι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υγείας είναι σε αυξημένο κίλημα νόσησης από ιλαρά, σε περίπτωση που δεν έχουν ανοσία. Συγκεκριμένα, απόμα του γεννήθηκαν μετά το 1957 θέωρούνται ανόσα όταν έχουν εμβολιαστεί με 2 δόσεις του εμβολίου έναντι της ιλαράς-πάρωματιδιας-ερυθράς (MMR), έχουν ιστορικό νόσησης από ιλαρά επιβεβαιωμένο από ιατρό ή ορολογική επιβεβαίωση ανοσίας. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας αισθηγεί τον εμβολιασμό των επίνοσων εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας με δύο δόσεις του εμβολίου MMR (ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων). Ο εμβολιασμός μπορεί να γίνει και 72 ώρες μετά από έκθεση στον ίδιο ιλαράς.

Επίνοσοι εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που πιθανόν εκτέθηκαν στον ίδιο ιλαρά πρέπει να απέχουν από την εργασία τους από την 5^η έως την 21^η ημέρα μετά την έκθεση άσχετα του αν έλαβαν ή όχι εμβόλια μετά την έκθεση. Άτομα του προσωπικού που εκδήλωσαν ιλαρά πρέπει να απομακρύνονται από την εργασία τους για διάστημα 5 ημερών.

